Freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken versus (unfreiwillige) künstliche Ernährung Ambulantes Ethikkomitee, Bezirksärztekammer Mainz, 1.10. 2024

Indikation und fragwürdige Indikation Zur künstlichen Ernährung

Prof. Dr. Roland Hardt

Zentrum für Allgemeinmedizin und Geriatrie

-Abteilung Geriatrie-

Universitätsmedizin Mainz

Einwohner 80J und älter in Deutschland

Ergebnisse der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung

Weight Change in Old Age and its Association with Mortality

- 4714 community-dwelling older adults > 65 y
- weight gain or loss of 5 % in a 3 year period

Figure 3. Mortality rates by weight change and baseline weight tertile.

Weight Change in Old Age and its Association with Mortality

Deutsche Definition - DGEM-Leitlinie

Fehlernährung

1. Unterernährung
2. Mangelernährung
 1. Krankheits-assoziiertes Gewichtsverlust
 2. Eiweißmangel
 3. Spezifischer Nährstoffmangel

Deutsche Definition - DGEM-Leitlinie

1. **Unterernährung:**

→ verminderte Fettmasse

BMI < 18,5 kg/m² (Erwachsene)

BMI < 20,0 kg/m² (Senioren)

Deutsche Definition - DGEM-Leitlinie

2. Mangelernährung

1. Krankheits-assoziiertes Gewichtsverlust:

→ signifikanter Gewichtsverlust mit Krankheitsaktivität

> 5 % in 3 Monaten

> 10 % in 6 Monaten

Deutsche Definition - DGEM-Leitlinie

2. Mangelernährung

2. Eiweißmangel

- verminderte Eiweißmasse
- verminderte Muskelmasse

Deutsche Definition - DGEM-Leitlinie

2. Mangelernährung

3. Spezifischer Nährstoffmangel

→ Mangel essentieller Nährstoffe

(Wasser, Vitamine, Mineralien,
Spurenelemente, essentielle
Fettsäuren)

Mangelernährung

- ist die häufigste Komorbidität im Alter.
- verlängert den Krankenhausaufenthalt.
- erhöht die Komplikationsrate.
- geht mit einer hohen Mortalität einher.
- verursacht hohe Kosten im Gesundheitswesen. (1)

Energie- und Flüssigkeitsbedarf im Alter

30 kcal/kg KG / d

anpassen an
Erkrankung, körperlicher
Aktivität und Zielgewicht

30 ml/kg KG / d

1500 – 2000 ml / d

Therapie der Malnutrition

Dysphagie - Ursachenspektrum

- Mechanisch: Struma, Tumore, Divertikel, DISH, Achalasie, Entzündungen (Pharynx, Ösophagus), Ulzerationen etc.
- Schlaganfall
- Degenerative neurologische Erkrankungen
 - M. Parkinson
 - Polyneuropathie (z.B. critical illness PNP)
 - Demenz

Jährliches Schlaganfall-Risiko

Indikationen zur künstlichen Ernährung bei Dysphagie

- Beherrschung lebensbedrohlicher Zustände
 - Intensivmedizin
- Überwindung (potentiell) reversibler Probleme
 - Parkinson – Krise
 - Schlaganfall (Frühphase) mit Reha - Potential
 - Aspirationspneumonie
- Sicherstellung ausreichender Nahrungszufuhr bei chronischen Prozessen und subjektiv guter Lebensqualität
 - Z. n. Schlaganfall
 - M. Parkinson mit Aspirationsgefahr

Senile Demenz vom Alzheimer - Typ (SDAT) und Alter

Betroffene/1000

Ernährungsprobleme bei Demenz

- Häufig schleichender Gewichtsverlust (Pat. vergisst zu Essen)
- Depressive Verstimmung
- In fortgeschrittenen Stadien auch neurologische Probleme – Dysphagie
- Initial häufig Probleme bei der Flüssigkeitsaufnahme
- Überlastung von Angehörigen – „Ich kann meine Mutter / meinen Vater doch nicht verhungern / verdursten lassen“

PEG – Versorgung bei fortgeschrittener Demenz

NIH Public Access

Author Manuscript

J Am Geriatr Soc. Author manuscript; available in PMC 2013 October 01.

Published in final edited form as:

J Am Geriatr Soc. 2012 October ; 60(10): 1918–1921. doi:10.1111/j.1532-5415.2012.04148.x.

Does Feeding Tube Insertion and its Timing Improve Survival?

Joan M. Teno, M.D., M.S.^{*}, Pedro L. Gozalo, Ph.D.^{*}, Susan L. Mitchell, M.D., M.P.H.[†], Sylvia Kuo, Ph.D.^{*}, Ramona L. Rhodes, M.D., M.P.H.[‡], Julie P.W. Bynum, M.D., M.P.H.[§], and Vincent Mor, Ph.D.^{*}

^{*}The Center for Gerontology and Health Care Research, The Warren Alpert School of Medicine of Brown University, Providence, RI

[†]Hebrew SeniorLife Institute for Aging Research, Boston, MA

[‡]University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX

[§]The Dartmouth Institute at Dartmouth Medical School, Hanover, NH

PEG – Versorgung bei fortgeschrittener Demenz

Background/Objectives—The objective of this study was to examine survival with and without a percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) feeding tube using rigorous methods to account for selection bias. A second objective was to examine whether the timing of feeding tube insertion affected survival.

Design—Prospective cohort study

Setting—All U.S. Nursing Homes

Participants—36,492 nursing home residents with advanced cognitive impairment from dementia and new problems eating studied between 1999–2007.

Measurements—Survival following the development of the need for eating assistance and feeding tube insertion.

PEG – Versorgung bei fortgeschrittener Demenz

PEG – Versorgung bei fortgeschrittener Demenz

PEG – Versorgung bei fortgeschrittener Demenz

- „.....health care providers can have confidence that feeding tubes does not prolong survival and that earlier timing of insertion does not affect survival, as well.“

Ethische Entscheidung für oder gegen künstliche Ernährung (PEG – Versorgung) in der Geriatrie - Kriterien

- Patientenwille - „Shared decision making“
- Zeitnahe Entscheidung bei potentiell reversiblen Störungen
- Bei chronischen Prozessen ist die Lebensqualität entscheidend
- Zurückhaltung in fortgeschrittenen Demenzstadien (für die Flüssigkeitsaufnahme kann im Einzelfall vorübergehend die Pflegesituation erleichtert werden)
- Die Indikation zur künstlichen Ernährung ist keine einmalige Entscheidung, sondern bedarf der regelmäßigen Überprüfung

Künstliche Ernährung – Wann beenden?

- Die Entscheidung eine Therapie zu beenden unterliegt den selben ethischen Prinzipien wie die Entscheidung sie gar nicht zu beginnen
- An dem Punkt, an dem der Patient nicht stirbt, weil ein nichts mehr isst und trinkt, sondern immer weniger oder nichts mehr isst und trinkt, weil er in eine, auch längerdauernde Sterbephase eingetreten ist
- Lernen, den Tod des Patienten nicht als narzisstische Kränkung zu erleben